

Diagnostika infekčních onemocnění				
Sérologická vyšetření (krev)	Bakteriologická vyšetření			PCR vyšetření*
Hepatitidy (S)	☐ AEROBNÍ KULTIVACE	Vyšetření pohlavní soustavy	Screening MRSA	Průkaz nukleové kyseliny
Hepatitida A	☐ AEROBNÍ + ANAEROBNÍ	☐ výtěr z pochvy	☐ výtěr z krku	☐ HBV DNA – kvalita
☐ Anti-HAV IgG	KULTIVACE	☐ výtěr z pochvy - screening Str. agalactiae (GBS)	☐ výtěr z nosu	☐ HBV DNA – kvantita
☐ Anti-HAV IgM		☐ CITLIVOST NA ANTIMYKOTIKA	☐ stěr z	☐ HCV RNA – kvalita
Hepatitida B		☐ výtěr z vulvy	☐ stěr z	☐ HCV RNA – kvantita
☐ HBsAg	Vyšetření dýchacích cest	☐ výtěr z cervixu	☐ stěr z	☐ HCV RNA – genotyp
☐ Anti-HBs	☐ výtěr z krku, tonzil	☐ MOP - mikrobiální obraz poševní	☐ stěr z	☐ HPV low risk DNA
☐ Anti-HBc	☐ výtěr z nosu	☐ výtěr z uretry	Screening ESBL	☐ HPV high risk DNA
☐ Anti-HBc IgM	☐ výtěr z nosohltanu	☐ stěr z penisu	☐ stěr z	☐ HSV-1, 2 DNA
☐ HBeAg	☐ výtěr z dutiny ústní	☐ ejakulát, sperma	☐ stěr z	☐ VZV DNA
☐ Anti-HBe	☐ výtěr z hrtanu	☐ prostatický sekret	☐ stěr z	☐ EBV DNA
Hepatitida C	☐ sputum	Ostatní	☐ stěr z	☐ CMV DNA
☐ Anti-HCV	☐ stěz z tracheální kanyly	☐ stěr ze spojivek P ☐ L ☐	☐ stěr z	☐ Enteroviry RNA
Ostatní serologická vyšetření (S)	☐ TAS - tracheální aspirát	☐ stěr z oka P ☐ L ☐	☐ stěr z	☐ Chlamydia trachomatis DNA
☐ Borrelia burgdorferi s.l. - IgM, IgG (screening protilátek)	☐ BAL - bronchoalveolární laváž	☐ výtěr ze zvukovodu P ☐ L ☐	Kultivace urogenitálních mykoplazmat	☐ Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae DNA (CT/NG)
☐ Borrelia burgdorferi s.l.- IgM, IgG - Western Blot		☐ výtěr ze stř. ucha P ☐ L ☐		☐ Chlamydia pneumoniae DNA
☐ EBV VCA - IgM, VCA - IgG, EBNA - IgG, EA - IgG	Vyšetření trávicí soustavy	☐ stěr z rány	☐ výtěr z uretry	☐ Mycoplasma pneumoniae DNA
☐ CMV - IgM, IgG, avidita	☐ výtěr z recta	☐ stěr z ložiska	☐ výtěr z pochvy	☐ Borrelia burgdorferi s. l. DNA
☐ HSV 1, 2 - IgM, IgG	☐ výtěr z recta - návrat z ciziny	☐ stěr z kůže	☐ stěr z cervixu	☐ Clostridium difficile (toxigenní kmeny) DNA
☐ VZV - IgM, IgG	☐ stolice-antigen Rotaviry, Adenoviry, Noroviry	☐ stěr z dekubitu	☐ moč	Materiál
☐ Toxoplasma gondii - IgM, IgG, avidita		☐ stěr z bércového vředu	☐ sperma	
☐ Příušnice - IgM, IgG	☐ stolice - toxin Clostridium difficile	☐ punktát z	Průkaz antigenu Chlamydia trachomatis	☐ Sérum
☐ Mycoplasma pneumoniae - IgM, IgG		☐ tekutina z		☐ Plasma
☐ Chlamydophila (Chlamydia) pneumoniae - IgM, IgA, IgG	☐ stolice - antigen Helicobacter pylori	☐ hnis z	☐ výtěr z uretry	☐ Plná krev
☐ Bordetella pertussis toxin - IgA, IgG		☐ stěr z abscesu	☐ výtěr z pochvy	☐ Mozkomíšní mok
☐ HIV-1, 2 Ab/Ag	☐ Grahamův stěr-vyšetření na Roupa dětského	☐ stěr z pštěle	☐ stěr z cervixu	☐ Moč
☐ HIV-1, 2 Ab/Ag + certifikát		☐ tkáň z	☐ moč	☐ Stolice
☐ Treponema pallidum (screening celkových protilátek),RPR		☐ jiný materiál		☐ Výtěr z uretry
☐ Chlamydia trachomatis - IgA, IgG	Vyšetření močové soustavy		Průkaz antigenů respiračních virů	☐ Cervikální stěr
☐ Tetanus toxoid - IgG	☐ moč (střední proud)	Cizorodý materiál		☐ Vaginální výtěr pro CT/NG
☐ Helicobacter pylori - IgG kvalitativně	☐ moč cévkovaná	☐ Kanyla močová	☐ výtěr z nosu	☐ Kožní stěr
☐ Klíšťová encefalitida - IgM, IgG	☐ moč z permanentního katetru	☐ Kanyla dialyzační	☐ výplach z nosu	☐ Stěr z oka
☐ Morbilli (spalničky) - IgM, IgG	☐ moč - odběr do URICULT	☐ Kanyla jiná		☐ Výtěr z úst
☐ Rubeola (zarděnky) - IgM, IgG		☐ IUD	☐ Adenoviry, RS virus	☐ Výtěr z krku
Adresa / telefon pacienta (rektální výtěry, epidemiologický významaná vyšetření):			☐ Virus chřipky A, B	☐ Výtěr nosohltan
	Léčba ATB (druh a délka léčby):			☐ Plicní aspirát
				☐ Punktát
				☐ Sputum
				☐ Jiný
Poznámky:			* Pacient souhlasí s vyšetřením.	